




سٹرابیری کی بہتر پیداوار کے لیے کھادوں کی سفارشات



احسان الحق، شہزادہ منور مہدی، رضوان خالد

ادارہ زرخیزی زمین و تجزیہ اراضی پنجاب

ٹھوکر نیاز بیگ ملتان روڈ لاہور

فون نمبر: 042-99260323 فیکس نمبر: 042-99260322

ای میل ایڈریس: director_sfri@yahoo.com ویب سائٹ: www.sfripunjab.gov.pk

سٹرا بیرری کے لیے کھادوں کی سفارشات

زمین کی تیاری اور کھادوں کا استعمال:

سٹرا بیرری نامیاتی مادے کی موجودگی میں اچھی پیداوار دیتی ہیں۔ اس لیے اچھی طرح گلی سٹری گوبر کی کھاد بحساب 20-15 ٹن فی ایکڑ زمین کی تیاری کے دوران زمین میں ملا دیں۔ تمام زمینوں اور آب و ہوا میں سٹرا بیرری کے پودوں کو کیمیائی کھادوں کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر افزائش کے ابتدائی سال میں نائٹروجنی کھادوں کا استعمال بہت سود مند ہے۔ اس لیے بجائی کے وقت 2.5 بوری یوریا، 3.5 بورکھ (18% SSP) اور 1.5 بوری SOP کھادیں فی ایکڑ زمین میں ملا دیں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی یوریا کھاد استعمال کی جائے اس کے فوراً بعد پانی لگا دینا چاہیے۔

آپاشی

دسمبر میں اوس اور کورے سے بچاؤ کے لیے مناسب وقفے سے پانی دینا چاہیے۔ قطرہ قطرہ آپاشی (Drip Irrigation) ایک اور مناسب طریقہ ہے۔

جڑی بوٹیوں اور نقصان دہ کیڑوں کا تدارک

جری بوٹیوں کی تلفی کے لیے زرعی ادویات کا استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن جڑی بوٹیوں کو ہاتھ سے نکال دینا زیادہ موزوں ہے۔ یا اگر ہو سکے تو اکھیڑ دیں۔ پودوں کو نقصان دہ کیڑوں اور بیماریوں کے حملے سے بچانے کے لیے زہر مار ادویات کا مناسب استعمال ضروری ہے۔ پودوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے جراثیم کش زرعی ادویات سپرے کرنی چاہیں۔

پھل اٹھانے اور سنبھالنے کا طریقہ

کامیاب کاٹنکار وہی ہے جو پھل کو مناسب وقت پر توڑ کر سنبھالتا ہے۔ اور کواٹھی کے اعتبار سے ان کی درجہ بندی کر کے فوراً مارکیٹ تک پہنچاتا ہے۔ تاکہ فصل کا زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے۔

سٹرا بیرری ویسے تو ٹھنڈی آب و ہوا کا پھل ہے مگر جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی بدولت اب ایسی اقسام تیار کی گئی ہیں جو معتدل اور گرم آب و ہوا میں بھی اچھی پیداوار دیتی ہیں۔ پاکستان میں بھی اب یہ وسیع پیمانے پر کاشت ہو رہی ہے۔ مینگورا، سوات، لاہور، ملتان، مظفر گڑھ اور سندھ کے علاقوں میں کامیابی سے کاشت کی جا رہی ہے۔

اس کا پھل جلدی آجاتا ہے اور اپنی دکش رنگت کی باعث باغ کا خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈٹامن سی، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسٹرا بیرری اپنی رنگت، خوشبو، جوس اور ذائقہ کے باعث بہت پسند کی جاتی ہے۔ یہ پھل تازہ بھی کھایا جاتا ہے اور اس کا جوس، کیک، آئس کریم اور ملک شیک پوری دنیا میں مشہور ہیں۔

وقت کاشت

عام طور پر سٹرا بیرری پہلے سے موجود پودوں کی شاخوں سے ہی اگائی جاتی ہے۔ بہترین قلم کی عمر تقریباً ایک سال ہونی چاہئے۔ جس کے ساتھ جڑوں کی مناسب تعداد ہونی چاہیے۔ اور لمبائی سات سے آٹھ انچ ہو۔ ان کو اگانے کے لیے ریختی میرا زمین مناسب ترین ہے۔ تاکہ بعد میں اکھیڑنے اور کاشت میں آسانی ہو۔ موسم بہار کا شروع ان کی قلموں کا مناسب ترین وقت کاشت ہے۔ خزاں کی کاشت موزوں نہیں ہے۔ کیونکہ سردیوں کی آمد سے پودوں کا بچاؤ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جڑی بوٹیوں کا بھی اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔

طریقہ کاشت

قطاروں میں کاشت زیادہ مناسب ہے۔ اور پودوں کا درمیانی فاصلہ 1.5 سے 2.5 فٹ ہونا چاہیے۔ قطاروں کے درمیان 3 سے 4 فٹ فاصلہ رکھنا چاہیے۔ اس طریقہ سے کاشت کیے گئے پودوں کی سنبھال اور جڑی بوٹیوں کی تلفی میں آسانی رہتی ہے۔

”مختلف کھادوں میں موجود اجزا کی تفصیل (فیصد)“

| کھاد | فیصد | | |
|--------------------|---------|---------|-------|
| | ناٹروجن | فاسفورس | پوٹاش |
| ڈی۔ اے۔ پی | 18 | 46 | 0 |
| مونو امونیم فاسفیٹ | 11 | 48 | 0 |
| ٹریپل سپر فاسفیٹ | 0 | 46 | 0 |
| امونیم سلفیٹ | 21 | 0 | 0 |
| امونیم نائٹریٹ | 26 | 0 | 0 |
| ناٹرو فاس | 23 | 23 | 0 |
| یوریا | 46 | 0 | 0 |
| پوٹاشیم کلورائیڈ | 0 | 0 | 60 |
| پوٹاشیم سلفیٹ | 0 | 0 | 50 |
| سنگل سپر فاسفیٹ | 0 | 14 | 0 |
| سنگل سپر فاسفیٹ | 0 | 18 | 0 |

”مختلف کھادوں میں موجود عناصر صغیرہ کی تفصیل (فیصد)“

| | |
|----------------|------------------|
| مونو ہائیڈریٹ | 21 فیصد زنک |
| ہیپٹا ہائیڈریٹ | 33 فیصد زنک |
| میزگانیز سلفیٹ | 30 فیصد میزگانیز |
| کاپر سلفیٹ | 24 فیصد کاپر |
| فیرس سلفیٹ | 20 فیصد آئرن |
| بوکس | 11 فیصد بورون |
| بورک ایسڈ | 17 فیصد بورون |