



تل کی بہتر پیداوار کے لیے کھادوں کی سفارشات



لیاقت علی، شہزادہ منور مہدی، ریاض احمد، ندیم اقبال، محمد اکرم قاضی

ادارہ زرخیزی زمین و تجزیہ اراضی پنجاب

ٹھوکر نیاز بیگ ملتان روڈ لاہور

فون نمبر: 042-99260323 فیکس نمبر: 042-99260322

ای میل ایڈریس: director_sfri@yahoo.com ویب سائٹ: www.sfripunjab.gov.pk

”مختلف کھادوں میں موجود اجزاء کی تفصیل (فیصد)“

کھاد	فیصد		
پوناش	فاسفورس	نائٹروجن	
0	46	18	ڈی۔ اے۔ پی
0	48	11	مونو امونیم فاسفیٹ
0	46	0	ٹریپل سپر فاسفیٹ
0	0	21	امونیم سلفیٹ
0	0	26	امونیم نائٹریٹ
0	23	23	نائٹرو فاس
0	0	46	یوریا
60	0	0	پوٹاشیم کلورائیڈ
50	0	0	پوٹاشیم سلفیٹ
0	14	0	سنگل سپر فاسفیٹ
0	18	0	سنگل سپر فاسفیٹ

”مختلف کھادوں میں موجود عناصر صغیرہ کی تفصیل (فیصد)“

مونو بانڈریٹ	21 فیصد زنک
ہیپٹا بانڈریٹ	33 فیصد زنک
میدگانیز سلفیٹ	30 فیصد میڈگانیز
کاپر سلفیٹ	24 فیصد کاپر
فیرس سلفیٹ	20 فیصد آئرن
بوٹیکس	11 فیصد بورون
بورک ایسڈ	17 فیصد بورون

☆	جڑی بوٹیوں کی تلافی	-6
☆	مختلف طریقے: زرع طریقے اور کیمیائی طریقے	
☆	زرع طریقے:	☆
	پہلی گوڈی پودے نکلنے کے بعد پہلا پانی لگانے سے پہلے اور دوسری گوڈی حسب ضرورت پانی لگانے کے بعد وتر آنے پر کریں۔	
☆	کیمیائی طریقے:	
☆	مناصب زہروں کا استعمال	
☆	زرہوں کا تعین، مقدار، طریقہ اور وقت استعمال	
	اسٹامپ 30 30 3 ای سی بحساب 1.25 لٹرنی ایکٹروائی کے بعد وتر میں یا بجائی کے فوراً بعد سپرے کریں۔	
-7	☆	☆
	فصل کی برداشت	
☆	کٹائی اور گھائی کے لیے ہدایات	
	جب 90-95 فی صد پتے جھڑ جائیں اور پودوں کی پختی 3/4 حصہ اور پھلیاں زرد ہو جائیں تو ان کا منہ کھلنے سے پہلے پودے کاٹ لیں۔ چھوٹے چھوٹے گٹھے بنا کر مہاروں پر سیدھے کھڑے کر دیں۔ خشک ہونے پر الٹا کر کے جھاڑ لیں۔	
☆	☆	
	پیداوار سنٹور کرنا۔	
	جب 8-10 فیصد رہ جائے تو سنٹور کر لیں۔	
☆	☆	
	برآمد کے لیے معیاری جنس حاصل کرنے کیلئے خصوصی ہدایات	
	بیج صاف ہو۔ بیج میں زیادہ نمی نہ ہو۔ کمزور بیج علیحدہ کر لیں۔	